

Rozsah registrácie prípravku Spintor v záhradníctve

Plodina	Škodlivý činiteľ	Koncentrácia v %	Dávka na 10l vody a 100m ²	Čakacia lehota v dňoch	Povolené kombinácie a poznámky
zemiaky	<u>Pásavka zemiaková</u>		1,5-2ml	7 dní	Vyššia dávka sa použije na larvy vo vyšších štádiách (prevažuje L3)
kapustová zelenina	<u>Mlynárik kapustový</u>		4ml	3 dni	
kapustová zelenina	<u>Mora kapustová</u>		4-5ml	3 dni	Vyššia dávka sa odporúča pri vyššom výskyte škodcu.
slivky	<u>Obafovač slivkový</u>		4-5ml	7 dní	Vzhľadom na kratšiu ochrannú dobu sa aplikuje predovšetkým proti 2. generácii obafovača.
jablone	<u>Obafovač jablčný (1. generácia)</u>		6ml	7 dní	Aplikácia je vhodná v čase, keď chceme zasiahnuť ešte ďalších škodcov ako piliarky, hrčiariky, nosániky, podkopáčky a pod.
jablone	<u>Obafovače</u>		6ml	7 dní	Aplikácia je vhodná v čase, keď chceme zasiahnuť ešte ďalších škodcov ako piliarky, hrčiariky, nosániky, podkopáčky a pod.
vinič	<u>Obafovače na viniči</u>		2-3ml	14 dní	Vyššia dávka sa odporúča na druhú generáciu škodcov.
kapustová zelenina	<u>Húsenice motýľov</u>		3-4ml	3 dni	Vyššia dávka sa odporúča pri vyššom výskyte škodcu.
pór	<u>Stranky</u>		4ml	7 dní	
cibuľa	<u>Stranky</u>		4ml	7 dní	
raičiak	<u>Stranky</u>	0,04%	4ml	3 dni	Aplikácia v skleníkoch.
paprika	<u>Stranky</u>	0,04%	4ml	3 dni	Aplikácia v skleníkoch.